



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	551
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	17817
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	TUBER MIX
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat) Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 4, Cu: 1, Mn: 11.5, Mo: 0.3, Zn: 8.5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	TÜRKİYE
Net Ağırlıkları	1-5-10-15-20-25 kg
Depolama Sıcaklığı	0/45 °C
Diğer İşaretler	Uyarılar, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız, Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 10/05/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmenliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 10/05/2017

METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
TUBER MIX

Bor (B), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti edilen içerik

	% w/w
Suda çözünür Bor (B)	4
Suda çözünür Bakır (Cu)	1
Suda çözünür Mangan(Mn)	11,5
Suda çözünür Molibden (Mo)	0,3
Suda çözünür Çinko (Zn)	8,5



KULLANILDIĞI YERLER VE DOZAJI

TUBER MIX, bitki beslenmesinde önem arz eden mikro element eksikliklerinin giderilmesi amacıyla topraktan ve yapraktan kullanılır.

Sebzeler(Domates,biber,pathican..)	100-150 gr./ 100 lt su	Çiçeklenme başlangıcında 2-3 hafta ara ile uygulanır.
Havuç-Turp	150 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası
Meyveler(Narenciye,elma,armut..)	100-150 gr./ 100 lt .su	Meyveler ceviz iriliğine gelince ve yaz sürgününde uygulanır.
Fındık	150 gr/100 lt su	Çiçeklenme öncesi,sonrası ve meyve tutumundan sonra
Ayçiçeği	150 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında uygulanır.
Bağ	150 gr/da	Salkım olgunlaşmasından itibaren 2-3 uygulama
Pamuk	100-120 gr./da	Taraklanmadan hemen önce ve devamından hemen sonra.kullanılır
Mısır	150 gr./da	Bitkinin 6-8 yaprak döneminde uygulanır.
Şeker Pancarı	100 gr/ da	6-8 yapraklı dönemde kullanılır.
Patates	150 gr/ da	6-8 yapraklı döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Soğan	100 gr/ da	Dikimden itibaren 30 gün sonra 2 kez uygulanır.
Baklagiller	100 gr/ da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası
Buğdaygiller	100 gr / da	Kardeşlenme döneminde uygulama yapılır.
Süs Bitkileri	100 gr/100 lt su	Başlangıçtan itibaren 2-3 uygulama yapılır.
Kabakgiller (Kavun,Karpuz,..)	100 gr/da	Meyve oluşumundan itibaren 2-3 sefer uygulanır.
Yem Bitkileri	150 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.

Bunlar tavsiye edilen dozlar olup,uygulama zamanı ve uygulama miktarı için uzmana danışınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- *TUBER MIX, muhafaza edilecek depolar kuru olmalı,orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilmelidir.
- *Boşaltılan ambalajlar yakılmalı veya gömülerek ortadan kaldırılmalıdır, başka maksatla kullanılmamalıdır.
- *Kuvvetli güneş ışığında uygulama yapıyorsa, TUBER MIX, toprağa gömülüp sulanmalıdır.
- *Depolama sıcaklığı min. 0 C,max. 45 C olmalıdır.

UYARILAR

Asla uygun dozajı aşmayınız.Sadece gerekli olan verlerde kullanınız.

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatli okuyunuz.
- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde hemen bol su ile yıkayınız,
- * Yutulduğunda bol su içiniz ve hemen doktora başvurunuz.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
- * Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz,sigara içmeyiniz.
- * Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.

KARISABİLİRLİK ÖZELLİĞİ

Pestisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir.Uygulama yapılmadan önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilmektedir.Suda eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz başka bir kapta en az 10-15 lt.suda eritilip aletin deposuna aktarılır.Daha sonra tank su ile tamamlanır ve karıştırılıp yapraktan püskürtüleceği gibi topraktan veya salma sulama ile tabandan da verilebilir.

FİRMA BEYANI

Gübreleme sırasında koruma ve uyarılara uyunuz.İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA : LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC.LTD.ŞTİ.

Nöbethane Cad.Demirci İşhanı No: 42 / 28 Sirkeci / İSTANBUL
Tlf. 0212-5143745 Fax. 0212-5274651

Üretici Lisansı : 551
Ürün Tescil No :
İmal Tarihi : 2011
Son Kull.Tarihi : 2014
Şarj No :

NET AĞIRLIK : 1 KG.

TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polana Plaza No:1 Kat:4
No: 25 34300 Maslak / İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207

**EC FERTILIZER
TUBER MIX**

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

Garanti Edilen İçerik	% w/w
Suda Çözünür Bor (B)	4,0
Suda Çözünür Bakır (Cu)	1,0
Suda Çözünür Mangan (Mn)	11,5
Suda Çözünür Molibden (Mo)	0,3
Suda Çözünür Çinko (Zn)	8,5



KULLANILDIĞI YERLER VE DOZAJI

TUBER MIX, bitki beslemesinde önem arz eden mikro element eksikliklerinin giderilmesi amacıyla topraktan ve yapraktan kullanılır.

Sebzeler (Domates, biber, patlıcan, ...)	100-150 gr/100 lt su	Çiçeklenme başlangıcında 2-3 hafta ara ile uygulanır
Havuç – Turp	150 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası
Meyveler (Narenciye, elma, armut, ...)	100-150 gr/100 lt su	Meyveler ceviz büyüklüğüne gelince ve yaz sürgününde uygulanır
Fındık	150 gr/100 lt su	Çiçeklenme öncesi, sonrası ve meyve tutumundan sonra
Ayçiçeği	150 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrasında uygulanır
Bağ	150 gr/da	Salkım olgunlaşmasından itibaren 2-3 uygulama
Pamuk	100-120 gr/da	Taralamadan hemen önce ve devamından hemen sonra kullanılır
Mısır	150 gr/da	Bitkinin 6-8 yapraklı döneminde uygulanır.
Şeker pancarı	100 gr/da	6-8 yapraklı döneminde uygulanır.
Patates	150 gr/da	6-8 yapraklı döneminde 2-3 uygulama yapılır.
Soğan	100 gr/da	Dikimden itibaren 30 gün sonra 2 kez uygulanır.
Baklagiller	100 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası
Buğdaygiller	100 gr/da	Kardeşlenme döneminde uygulama yapılır.
Süs Bitkileri	100 gr/100 lt su	Başlangıçtan itibaren 2-3 uygulama yapılır.
Kabakgiller (Kavun-Karpuz...)	100 gr/da	Meyve oluşumundan itibaren 2-3 sefer uygulanır.
Yem Bitkileri	10 gr/da	Çiçeklenme öncesi ve sonrası uygulanır.

Not: Uygulama dozunu en doğru şekilde belirlemek için toprak ve yaprak analizini yaptırmak gereklidir.

Bunlar tavsiye edilen dozlar olup, uygulama zamanı ve uygulama miktarı için uzmana danışınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

muhafaza edilecek depolar kuru olmalı, orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilmelidir. Boşaltılan ambalajlar yakılmalı veya gömülerek ortadan kaldırılmalıdır, başka maksatla kullanılmamalıdır. Kuvvetli güneş ışığında uygulama yapılıyorsa, TUBER MIX toprağa gömülüp sulanmalıdır. Depolama sıcaklığı min. 0 °C, max. 45 °C olmalıdır.



UYARILAR

- *Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- *Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Uygulama sırasında maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz ve sigara içmeyiniz.
- *Deri ve gözle temastan kaçınınız.
- *Yutulduğunda bol su içiniz ve doktora başvurunuz.

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanımı tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK ÖZELLİĞİ: Pestisit ve yaprak gübrelere ile karışabilir. Uygulama yapılmadan önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilmektedir. Suda eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz başka bir kapta en az 10-15 lt suda eritilip aletin deposuna aktarılır. Daha sonra tank su ile tamamlanır ve karıştırılıp yapraktan püskürtüleceği gibi topraktan veya salma sulama ile tabandan da verilebilir.

FİRMA BEYANI: Gübreleme sırasında koruma ve uyarılara uyunuz. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Ahi Evran Cad.Polaris Plaza İş Merkezi No: 1 Kat.:4 D:25 Maslak-Şişli İSTANBUL -TÜRKİYE
Telf: (0212) 3461090 Fax : (0212) 3461064

Üretici Lisansı : 551
Ürün Tescil No :
İmal Tarihi :
Son Kul. Tarihi :
Şarj No :
NET MİKTAR : 1- 5 -10-15-20-25 kg

TAAHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

LARİS TARIM
LARİS TARIM ÜRÜNLERİ
İTH.VE TİC. LTD. ŞTİ.